




Hodowco! Czy wiesz już jak zatrzymać ASF?

Najważniejsze są najbliższe miesiące: maj-sierpień!
W tym czasie trzeba podjąć intensywne działania i skupić się
na najważniejszych zagrożeniach.

Jak to zrobić?



Polskie Mięso



1. Trzymaj dziki na dystans.

Ogrodzenie fermy musi być pełne na całej długości, bramy muszą być zamknięte.

Kontroluj teren wokół fermy minimum 1x na 2 tygodnie.

Jeśli stwierdzisz ślady bytowania dzików w jej sąsiedztwie, dodatkowo zabezpiecz ten obszar poprzez montaż ogrodzenia elektrycznego. Zastosuj preparaty odstraszające dziki i sznury hukowe.

Sznury hukowe, preparaty odstraszające stosuj przez kilka dni z rzędu, potem kilka dni przerwy, stosuj je naprzemiennie, aby zwierzęta zbyt szybko nie przyzwyczyły się do nich.

2. Zabezpiecz fermę siatkami przeciwko ptakom.

Można do tego celu wykorzystać tanią siatkę podtynkową.

3. Zabezpiecz przed ptakami miejsca składowania padliny.

Utrzymuj je w stałej czystości, dezynfekuj jak najczęściej.

Stosuj w tych miejscach preparaty przeciwko owadom latającym.

Ustal miejsce/kontener do przechowywania padłych zwierząt tak, aby było jak najdalej od budynków ze świniami.

4. Utrzymuj w czystości teren wokół fermy (rampy, okolice silosów, podjazdy, miejsca składowania padliny, pomieszczenia socjalne) i sprzęt rolniczy wjeżdżający na teren fermy.

Minimum 1x na 2 tygodnie wykonuj sprzątanie i dezynfekcję miejsc wokół fermy i sprzętu rolniczego.

5. Kontroluj czystość pojazdów wjeżdżających na teren fermy, a po każdej wizycie auta na terenie fermy **umyj i zdezynfekuj miejsca kontaktowe** - rampa, pojemniki i miejsca do składowania padliny.

6. Stosuj poprawnie **preparaty przeciwko owadom na zewnątrz obiektów jak i w środku**. Stosuj środki przeciwko postaciom dorosłym oraz przeciwko larwom (bytującym w kale lub gnojowicy).



PAMIĘTAJ, ŻE ZAPYLENIE WEWNĄTRZ FERMY I KURZ OSIADAJĄCY NA POWIERZCHNIACH OGRANICZA DZIAŁANIE WIELU PREPARATÓW!

Minione lata pokazują, że największa liczba zakażeń świń przypadała na okresy letnie. Jeśli nie wpuścimy wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń do naszych stad w najbliższych 3 miesiącach, wygramy.

Największym zagrożeniem dla Twojej fermy jest dzik, człowiek i mucha.

**HODOWCO! NIE DAJ SIĘ POKONAĆ WIRUSOWI ASF !
BĄDŹ SPRYTNIJSZY!**